

EMPFEHLUNG FÜR DAS VERHALTEN NACH DER KIEFEROPERATION

- Ungefähr 30 Minuten auf den Tupfer beißen, dann kann dieser entfernt werden. Falls es noch blutet, erneut einen Tupfer einlegen und während weiteren 30 Minuten auf den Tupfer beißen.
Prozedere wiederholen bis es nicht mehr blutet. Möglichst wenig spülen.
- Gegen die postoperativen Beschwerden (Schmerzen und Schwellung) können Sie Irfen 400 mg maximal 3 mal täglich einnehmen.
Die Wirkung tritt innerhalb von 20-40 Minuten nach der Einnahme ein und hält einige Stunden an. Wenn Sie mehr als drei Tabletten pro Tag benötigen, möchten wir informiert werden.
- Als Infektionsschutz spülen Sie während einer Woche dreimal täglich mit Curasept Mundspülung: Eine Minute im Mund bewegen, dann ausspucken und nicht nachspülen.
- Kalte Umschläge in den ersten zwei Tagen nach der Operation lindern die postoperativen Beschwerden und die Schwellung.
- Vermeiden Sie in den ersten drei Tagen nach der Operation starke körperliche Anstrengungen, Sport u.ä.
- Die Gesichtsschwellung wird am zweiten und dritten Tag nach der Operation am stärksten sein.
Versuchen Sie, nachts den Kopf auf mindestens einem Kissen hoch zu lagern.
- Häufig wird als Wunddrainage ein Gazestreifen in die Extraktionswunde eingelegt.
Wenn dieser Drainage-Streifen aus der Wunde gestossen wird und stört, dürfen Sie ihn entfernen: Zug mit Daumen / Zeigfinger oder einer Pinzette.
- Temperaturerhöhung bis 38.5 Grad ist möglich.
Wenn Sie höheres Fieber haben, müssen Sie uns informieren.
- Die Medikamente, die Sie von uns erhalten und nicht vollständig aufgebraucht werden, können Sie uns bei der Kontrolle auf Wunsch zur Entsorgung zurückbringen. Eine Vergütung ist jedoch nicht möglich.

Bei allen Unklarheiten rufen Sie uns bitte an